

# DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Instrucciones para tomografía TAC





# INSTRUCCIONES PARA TOMOGRAFÍA (TAC)

TOMOGRAFÍA	PREPARACIONES
TAC. Cráneo Trauma, descarte de ICTUS hemorrágico	Ninguna preparación
TAC. Cráneo Descarte de masa, tumores o migraña	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ayuno mínimo de 6 horas</li><li>• Examen de creatinina para uso de medio de contraste</li></ul>
TAC. Senos paranasales	Ninguna preparación
TAC. de órbitas Trauma ( descarte de fractura)	Ayuno mínimo de 6 horas y creatinina para uso de medio contraste
TAC. de oídos	Ninguna preparación
TAC. Maxilo facial por masa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ayuno mínimo de 6 horas</li><li>• Examen de creatinina para uso de medio de contraste</li></ul>
TAC. Columna cervical	Ninguna preparación
TAC. de cuello	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ayuno mínimo de 6 horas</li><li>• Examen de creatinina para uso de medio de contraste</li></ul>



## INSTRUCCIONES PARA TOMOGRAFÍA (TAC)

TAC. de hombro y clavícula Descartarte fractura/trauma	Ninguna preparación
TAC. de torác Descartarte traumas/fracturas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ayuno mínimo de 6 horas</li><li>• Examen de creatinina para uso de medio de contraste</li></ul>
TAC. de torác por masa Descartarte de metástasis o evaluación de quiste.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ayuno mínimo de 6 horas</li><li>• Examen de creatinina para uso de medio de contraste</li></ul>
TAC. de torác de alta resolución	Ninguna preparación
TAC. de abdomen completo superior/inferior	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ayuno mínimo de 6 horas</li><li>• Examen de creatinina para uso de medio de contraste</li></ul>
TAC. Urotac/Pielotac	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ayuno mínimo de 6 horas</li><li>• Examen de creatinina para uso de medio de contraste</li></ul>



# INSTRUCCIONES PARA TOMOGRAFÍA (TAC)

TAC. Colotac	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 día antes a las 3 p.m. tomar 2 onzas de aceite de recno en un vaso de jugo de najanra, cena liviana (gelatina, sopas, pan tostado, té, etc)</li><li>• Realizarse un fleet para limpiar el intestino a las 8 p.m y uno a las 5 a.m antes de presentarse al estudio</li><li>• Ayuno mínimo de 8 horas</li><li>• Examen de creatinina para uso de medio de contraste</li></ul>
TAC. de pelvis/caderas Fractura, dolor, lesión ósea	Ninguna preparación
TAC. de rodillas	Ninguna preparación
TAC. de tobillo/pie	Ninguna preparación
TAC. de mano/codo	Ninguna preparación
Todas las angiografías (angiotomografías) de cualquier región	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ayuno mínimo de 6 horas</li><li>• Examen de creatinina para uso de medio de contraste</li></ul>



# **POR FAVOR TOMAR EN CUENTA**

**Nota 1:** El resultado del examen de creatinina tiene validez de 1 mes.

**Nota 2:** Preparaciones sujetas a cambios dependiendo de indicaciones especiales en la orden del médico tratante.



# PARA MÁS INFORMACIÓN

 2279-5000 EXT: 2300/2301

 Whatsapp 3760-1813

Personal capacitado le brindará la información que necesita.

#Tú nuestra razón de *ser*



Síguenos en nuestras redes sociales como Hospital El Pilar

